

ご使用に際しては、必ずこの説明書をお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保存してください。

宝生(エキス顆粒)

[成 分]

本品3包(1包2.0g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)1.2gを含有します。

サイコ	2.0g	オウゴン	1.5g	カシグウ	1.0g
ハシゲ	2.0g	タイソウ	1.0g		
ショウキョウ	2.0g	ニンジン	1.0g		

[効能・効果]

はきけ、食欲不振、胃炎、胃腸虚弱、疲労感及び風邪の後期の症状

[用法・用量]

成人(15才以上) 1回1包

7~14才	1回2/3包	4~6才	1回1/2包
2~3才	1回1/3包	2才未満	1回1/4包以下

いずれも1日3回、食間に服用します。

(食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。)

[使用上の注意]

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 血圧の高い人又は高齢者
- (2) 心臓又は腎臓に障害のある人
- (3) むくみのある人
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 医師の治療を受けている人
- (6) インターフェロン製剤で治療を受けている人

2. 服用に際して、次のことに注意してください

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は、生後3ヶ月未満の乳児に服用させないでください。なお、生後3ヶ月以上であっても1才未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないでください。

3. 服用中又は服用後は、次のことに注意してください

- (1) 本剤の服用により、咳、息切れ、呼吸困難、発熱、発疹・発赤、かゆみ、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (2) 本剤を服用することにより、尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (3) 1ヵ月位(かぜの場合は1週間位)服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (4) 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 保管取り扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (4) 本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがありますが品質には変わりありません。

この医薬品についてのお問い合わせ先 お客様相談室 ☎03-3843-3831

株式会社 造林松鶴堂

〒110-0015 東京都台東区東上野4-3-1

9803D